

my recognition is not very far from practice, the parent of these hybrids may be *Rubus trifidus* THUNB. and *R. coptophyllus* ASA GRAY.

The writer is much indebted to Prof. T. Nakai and Mr. F. Maekawa and he expresses his thanks and gratitude for their suggestions and courtesy.

## Flora of Karuizawa IV.

By

Hiroshi HARA.

原 寛：輕井澤ノ「フローラ」(其四)

### 25) *Chenopodiaceae*.

- 145) *Chenopodium album* LINNAEUS, Sp. Pl. ed. 1, p. 219 (1753). しるぎ  
Hab. Karuizawa plain, Mt. Kose, etc.

var. *centrorubrum* MAKINO in Bot. Mag. Tokyo XXIV, p. 16 (1910). あ  
かざ.

Hab. Karuizawa plain.

### 26) *Caryophyllaceae*.

- 146) *Cerastium vulgatum* LINNAEUS, Fl. Suec. p. 158 (1755)

var. *glandulosum* REGEL in LEDEBOUR, Fl. Ross. I, p. 404 (1842). み  
みなぐさ.

Hab. Karuizawa plain, Mt. Atago, Mt. Kose, etc.

- 147) *Cucubalus baccifer* LINNAEUS, Sp. Pl. ed. 1, p. 414 (1753).

var. *japonicus* MIQUEL, Prol. Fl. Jap. p. 142 (1866-67). なんばんはこべ.

Hab. Karuizawa plain, Mt. Atago, etc.

- 148) *Dianthus superbus* LINNAEUS, Fl. Suecica ed. 2, 146 (1755). えぞか  
はらなでしこ.

Hab. Karuizawa plain, Usui pass, Mt. Hanare, etc.

- 149) *Krascheninikovia heterophylla* MIQUEL in Arn. Mus. Bot. Lugd.  
Bat. III, p. 187 (1867). わださう.

Hab. Mt. Atago, Mt. Kose.

- 150) *Krascheninikovia Palibiniana* TAKEDA in Bot. Mag. Tokyo XXVI,  
p. 342 (1912). ひげねわちがひ.

Hab. Karuizawa plain, Mt. Atago, etc.

- 151) *Lychnis Miqueliana* ROHRBACH in *Linnaea* XXXVI, p. 677 (1869-70). ふしぐろせんとう.

Hab. Mt. Yagasaki, Mt. Hanare, Mt. Atago, etc.

- 152) *Melandrium firmum* ROHRBACH, *Monogr. Silene* p. 231 (1868). ふしぐろ.

Hab. Karuizawa plain.

- f. *pubescens* MAKINO in MAKINO et NEMOTO, *Fl. Jap.* ed. 2, 294 (1931). けふしぐろ.

Hab. Karuizawa plain, Mikasa.

- 153) *Moehringia lateriflora* FENZL in LEDEBOUR, *Fl. Ross.* I, p. 371 (1842). おまやまふすま.

Hab. Karuizawa plain, Mt. Atago, etc.

- 154) *Sagina maxima* A. GRAY, *Bot. Jap.* p. 38 (1859). つめくさ.

Hab. Karuizawa plain.

- 155) *Stellaria aquatica* SCOPOLI, *Fl. Carn.* ed. 2 I, p. 319 (1772). うしはこべ.

Hab. Karuizawa, Kumanotaira, etc.

- 156) *Stellaria Francheti* HONDA in *Bot. Mag. Tokyo* XLIII, p. 541 (1929). みやまはこべ.

Hab. Mt. Kose.

- 157) *Stellaria media* CYRILL, *Char. Comm.* p. 36 (1784). はこべ.

Hab. Karuizawa, Usui pass, etc.

- 158) *Stellaria paniculigera* MAKINO in *Bot. Mag. Tokyo* XXIII, p. 145 (1909). おほやまはこべ.

Hab. Mt. Yagasaki.

- 159) *Stellaria uliginosa* MURREY, *Prod. Stirp. Gotting.* p. 55 (1770). のみのふすま.

Hab. Karuizawa, Usui pass, Kose, etc.

## 27) *Eupteleaceae*.

- 160) *Euptelea polyandra* SIEBOLD et ZUCCARINI, *Fl. Jap.* I, p. 134 (1841). ふさぎくら.

Hab. Shin Usui pass, Mt. Yagasaki.

## 28) *Cercidiphyllaceae*.

- 161) *Cercidiphyllum japonicum* SIEBOLD et ZUCCARINI apud HOFFMANN et SCHULTES, *Nom. Indig. Pl. Jap. et Chin.* No. 131 (1814). かつら.

Hab. Mt. Kose.

29) *Ranunculaceae*.

162) *Aconitum japonicum* THUNBERG, Fl. Jap. p. 231 (1784).

var. *montanum* NAKAI in Bot. Mag. Tokyo XXII, p. 136 (1908). やまとりかぶと.

Hab. Karuizawa plain, Mt. Tomeo, Mt. Atago, etc.

163) *Aconitum pseudolaeve* NAKAI in Bot. Mag. Tokyo XXVII, p. 128 (1913).

var. *erectum* NAKAI, l. c. れいじんさう.

Hab. Usui pass, Kumoba, etc.

164) *Actaea acuminata* WALLICH, Cat. no. 4726 (1830). るゐえふしようま.

Hab. Mt. Kose, Mt. Kiritsumi, Kumoba, etc.

165) *Anemone Raddeana* REGEL, Pl. Raddea. p. 16 (1861). あづまいちげ.

Hab. Usui pass, Kumoba, Kyu-karuizawa, etc.

166) *Anemonopsis macrophylla* SIEBOLD et ZUCCARINI in Abh. Akad. Wiss. Muenchen IV-II, p. 182 (1845). れんげしようま.

Hab. Usui pass, Mt. Kiritsumi, Mt. Yagasaki, etc.

167) *Aquilegia Buergeriana* SIEBOLD et ZUCCARINI in Abh. Akad. Wiss. Muenchen IV-II, p. 183 (1845). やまおだまき.

Hab. Karuizawa plain, Usui pass, Mt. Kose, etc.

In this district, the colour of sepals is mostly light blackish purple or light yellow (*f. flavescens* MAKINO in Bot. Mag. Tokyo XXIV p. 141 (1910)).

168) *Cimicifuga obtusiloba* MIQUEL, Prol. Fl. Jap. p. 197 (1866-67). おぼばしようま.

Hab. Mt. Yagasaki, Usui pass, Mt. Hanare, etc.

169) *Cimicifuga simplex* WORMSK ex FISCHER in DC, Prodr. I, p. 64 (1824).

var. *intermedia* NAKAI in Bot. Mag. Tokyo XXX, p. 146 (1916). おくやましようま.

Hab. Usui pass, Kumoba, Kyu-karuizawa, etc.

var. *Matsumurai* NAKAI, l. c. p. 147 (1916). やましようま.

Hab. Kumoba.

var. *Tschonoskii* MATSUMURA et NAKAI, l. c. p. 146 (1916). みやましようま.

Hab. Mt. Tomeo.

The shape of leaves and the length of stipe of ovary are very variable.

170) *Clematis apiifolia* A. P. de CANDOLLE, Syst. Veg. I, p. 149 (1818).  
ぼたんづる.

Hab. Karuizawa plain, Mt. Kose, Mt. Atago, etc.

var. *bitermata* MAKINO in Bot. Mag. Tokyo XX, p. 8 (1906). めぼたんづる.

Hab. Karuizawa plain.

171) *Clematis heracleaefolia* A. P. de CANDOLLE, Syst. Veg. I, p. 138 (1818).

var. *stans* O. KUNTZE, Monog. Clemat. p. 183 (1885). くさぼたん.

Hab. Mt. Hanare, Mt. Yagasaki, etc.

172) *Clematis ochotensis* POIRET in DC., Prod. I, p. 10 (1824).

var. *japonica* NAKAI in sched. Herb. Univ. Imp. Tokyo.

Folia acute grosse serrata crassiora quam typica. Sepala atropurpurea vulgo crassiora margine densiore floccosa.

みやまはんしょうづる.

Hab. Mt. Kose, Mt. Atago, etc.

f. *apiciflora* HARA, f. nov.

Flores in apice rami hornotini elongati axillares. Sepala luteo-viridia vel atropurpurea. Receptacula semper viridia.

Hab. Mt. Kose (H. HARA-Jun. 21, Jul. 9 et Sep. 8, 1931-typus)

173) *Clematis ternata* MAKINO in Bot. Mag. Tokyo XXVI, p. 81 (1912).  
はんしょうづる.

Hab. Mt. Yagasaki, Mt. Nanken, etc.

174) *Isopyrum trachyspermum* MAXIMOWICZ in Bull. Acad. Imp. Sci. St.-Petersb. XXIX, p. 60 (1883). とうごくさばのを.

Hab. Kumoba, Mt. Kose.

175) *Paeonia japonica* MIYABE et TAKEDA in Gard. Chron. ser. 3, XLVIII, p. 366, f. 153 (1910). やましやくやく.

Hab. Usui pass, Mt. Atago Mt. Sando, etc.

f. *hirsuta* HARA, f. nov.

Folia subtus hirsuta.

けやましやくやく.

Hab. Mt. Atago (H. Hara-May 20, 1928).

176) *Pulsatilla cernua* SPRENG, Syst. Veg. II, p. 664 (1825). おきなぐさ.

Hab. Karuizawa plain, Mt. Kose, etc.

177) *Ranunculus aquatilis* LINNAEUS, Sp. Pl. ed. 1, p. 556 (1753).

var. *radiatus* BOREAN, Progr. Fl. Cent. France ed. 3, p. 11 (1857). おほいてふばいくわも。

Hab. in the stream of Kumoba.

This plant is recorded only from the above locality in Japan.

178) *Ranunculus japonicus* THUNBERG in Trans. Linn. Soc. II, p. 337 (1794). うまのあしがた。

Hab. Karuizawa plain, Usui pass, Mt. Atago, etc.

179) *Ranunculus pantothrix* BROTERO, Fl. Lusit. II, p. 375 (1804). てうせんばいくわも。

Hab. in the stream of Kose and Shin-karuizawa.

180) *Ranunculus Tachiroei* FRANCHET et SAVATIER, Enum. Pl. Jap. II, p. 267 (1876). をとこぜり。

Hab. Karuizawa plain.

181) *Ranunculus Vernyi* FRANCHET et SAVATIER, Enum. Pl. Jap. II, p. 266 (1876).

var. *japonicus* NAKAI in Bot. Mag. Tokyo XLII, p. 20 (1928). けきつねのぼたん。

Hab. Karuizawa plain, Kawagoeishi valley, etc.

182) *Thalictrum aquilegifolium* LINNAEUS, Sp. Pl. ed. 1, p. 547 (1753). からまつさう。

Hab. Karuizawa plain, Usui pass, etc.

183) *Thalictrum Rochebrunianum* FRANCHET et SAVATIER, Enum. Pl. Jap. II, p. 264 (1876). しきんからまつ。

Hab. Karuizawa plain, Mt. Kose, etc.

184) *Thalictrum simplex* LINNAEUS, Mant. I, p. 78 (1767).

var. *affine* REGEL in Bull. Soc. Imp. Nat. Mose. XXXIV, p. 14 (1861). のからまつ。

Hab. Karuizawa plain.

185) *Thalictrum Thunbergii* A. P. de CANDOLLE, Syst. Veg. I, p. 183 (1818).

var. *hypoleucum* NAKAI in Bot. Mag. Tokyo XLII, p. 3 (1928). あきからまつ。

Hab. Karuizawa plain, Mt. Atago, Mt. Hanare, etc.

186) *Thalictrum tuberiferum* MAXIMOWICZ in Bull. Acad. Imp. Sci. St.-Petersb. XXII, p. 227 (1877). みやまからまつ。

Hab. Usui pass, Mt. Kiritsumi, etc.

187) *Trautvetteria japonica* SIEBOLD et ZUCCARINI in Abh. Akad.

Wiss. Muenchen IV-II, p. 184 (1845). もみぢからまつ.

Hab. Mt. Yagasaki.

188) *Trollius hondoensis* NAKAI in Bot. Mag. Tokyo XLII, p. 8 (1928).

きんばいさう.

Hab. Mt. Yagasaki, Mt. Hanare, Karuizawa plain, etc.

30) *Lardizabalaceae*.

189) *Akebia pentaphylla* MAKINO in Bot. XVI, p. 30 (1902). ごえふあけび.

Hab. Mt. Atago, Mt. Kose, etc.

190) *Akebia quinata* DECAISNE in Ann. Sci. Nat. ser.-2, XII, p. 107 (1839). あけび.

Hab. Mt. Kose, Mt. Atago, Usui pass, etc.

191) *Akebia trifoliata* KOIDZUMI in Bot. Mag. Tokyo. XXXIX, p. 310 (1925). みつばあけび.

Hab. Mt. Atago, Mt. Kose, New Usui pass, etc.

var. *clematifolia* NAKAI in Bot. Mag. Tokyo XL, p. 494 (1926). まるばみつばあけび.

Hab. Mt. Atago, New Usui pass, etc.

31) *Berberidaceae*.

192) *Berberis Thunbergii* A. P. de CANDOLLE, Syst. Veg. II, p. 9 (1821)

var. *Maximowiczii* FRANCHET et SAVATIER, En. Plum Jap. I, 272 (1876). めぎ.

Hab. Mt. Kose, Usui pass, Kumoba, etc.

193) *Caulophyllum robustum* MAXIMOWICZ, Prim. Fl. Amur. p. 33 (1859). るゐえふぼたん.

Hab. Usui pass, Mt Kose.

腊葉ノ特異變色ニ就テ

刈 米 達 夫

T. KARIYONE: On the characteristic discoloration  
of the dried botanical specimens.

植物ノ腊葉ヲ製作スルトキニ屢々葉ガ藍黑色又ハ黑色ヲ呈スル場合ガアル。